

Příbalová informace: informace pro uživatele

Vitamin E Zentiva 100 mg měkké tobolky

Vitamin E Zentiva 200 mg měkké tobolky

Vitamin E Zentiva 400 mg měkké tobolky

tocoferoli alfa acetatas

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do několika dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Vitamin E Zentiva a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vitamin E Zentiva užívat
3. Jak se přípravek Vitamin E Zentiva užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Vitamin E Zentiva uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Vitamin E Zentiva a k čemu se používá

Přípravek Vitamin E Zentiva má významnou úlohu v organismu. Je zapojen do oxidoredukčních pochodů v rámci metabolismu základních složek buňky a stabilizuje některé hormony a enzymy. Zabraňuje vzniku toxických oxidačních produktů a vzniku volných kyslíkových radikálů, které působí škodlivě na organismus.

Přípravek Vitamin E Zentiva má široké použití při léčbě mnoha onemocnění.

Bez porady s lékařem lze vitamin E užívat k předcházení jeho nedostatku a pro jeho silný antioxidační účinek na mnoho látek – při nadměrné fyzické zátěži a k podpoře imunitních pochodů.

Po doporučení lékaře je určen:

- pacientům s poruchami výživy a vstřebávání, např. při nedostatečné výživě (jednostranná strava bez obsahu vitamínu E, podvýživa), stavech po operaci střev nebo žaludku, při onemocnění jater, při poruchách vstřebávání tuků a vitaminů rozpustných v tucích;
- jako doplňková léčba při poruchách plodnosti;
- jako doplňková léčba ke zmírnění obtíží během menstruace (snížení bolesti a krvácení);
- pro zlepšení některých potíží u žen v přechodu (návaly horka);
- pacientům s poruchami nervové a svalové tkáně, s neurologickými degenerativními onemocněními (např. Alzheimerova choroba), svalovou ochablostí a zánětlivými degenerativními změnami kloubů a chrupavky u chronických revmatických onemocnění;
- k podpůrné léčbě při poruchách funkce žláz s vnitřním vylučováním (např. poruchy funkce štítné žlázy, hormonální poruchy funkce pohlavních žláz, mužská neplodnost);
- k prevenci arteriosklerózy (např. ischemická choroba srdeční, cévní onemocnění mozku);

Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající a děti od 3 let.
Pokud se do několika dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vitamin E Zentiva užívat

Neužívejte přípravek Vitamin E Zentiva:

- jestliže jste alergický(á) na vitamin E (tokoferol-alfa-acetát) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
- u dětí do 3 let.
- jestliže jste alergický(á) na arašidy nebo sóju (viz bod 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Vitamin E Zentiva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

- pokud trpíte nedostatkem vitamínu K.

Pouze na doporučení lékaře smí přípravek užívat:

- těhotné a kojící ženy;
- děti mladší 12 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Vitamin E Zentiva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Užívání přípravku Vitamin E Zentiva současně s léky snižujícími krevní srážlivost (antikoagulantia) zvyšuje jejich účinek.

Přípravek Vitamin E Zentiva může snižovat účinek vitamínu K.

Bez doporučení lékaře neužívejte současně jiné přípravky s obsahem vitamínů a minerálů a jiné volně prodejné léky.

Přípravek Vitamin E Zentiva s jídlem, pitím a alkoholem

Přípravek se užívá nejlépe po jídle, tobolky se bez rozkousání zapijí 200 ml tekutiny.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, smíte přípravek používat pouze na výslovné doporučení lékaře. Přesné dávkování určí vždy lékař. Dávka u těhotných a kojících žen ve věku 14 až 18 let nemá překročit 800 mg denně, u těhotných a kojících žen starších 18 let 1 000 mg denně.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Vitamin E Zentiva nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Vitamin E Zentiva obsahuje červené barvivo Ponceau 4R a methylyparaben

Mohou způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).

Tento léčivý přípravek obsahuje sójový lecitin. Jestliže jste alergický(á) na arašidy nebo sóju, neužívejte tento léčivý přípravek.

3. Jak se přípravek Vitamin E Zentiva užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud nedoporučí lékař jinak, dospělí a děti starší 12 let obvykle užívají 200-400 mg denně po jídle. Tato denní dávka odpovídá 2 - 4 tobolekám přípravku Vitamin E Zentiva 100 mg nebo 1 - 2 tobolekám přípravku Vitamin E Zentiva 200 mg nebo jedné tobolece přípravku Vitamin E Zentiva 400 mg. Tobolky se bez rozkousání zapijí 200 ml tekutiny.

U dětí mladších 12 let určí dávkování vždy lékař.

V dávce 200 mg denně je možno přípravek užívat dlouhodobě. Tato dávka odpovídá 2 tobolekám přípravku Vitamin E Zentiva 100 mg nebo jedné tobolece přípravku Vitamin E Zentiva 200 mg.

V dávce 400 mg (odpovídá 4 tobolekám přípravku Vitamin E Zentiva 100 mg nebo 2 tobolekám přípravku Vitamin E Zentiva 200 mg nebo jedné tobolece přípravku Vitamin E Zentiva 400 mg) denně je po 2 měsících nutná 1 – 2 měsíční přestávka. Po uplynutí této doby je možno přípravek užívat další 2 měsíce.

Pokud užíváte na doporučení lékaře dlouhodobě vysoké dávky přípravku Vitamin E Zentiva nebo při používání u dětí, Vám (nebo Vašemu dítěti) může lékař upravovat dávkování podle hodnot vitamínu E v krvi.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Vitamin E Zentiva, než jste měl(a)

Dojde-li k předávkování nebo náhodnému požití většího množství přípravku dítětem, poradte se s lékařem.

Při předávkování se mohou objevit zažívací potíže.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Vitamin E Zentiva

Nezdvoujnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou toboleku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek je obvykle dobře snášen, pokud je dodržováno doporučené dávkování. Při užívání vysokých dávek (1 g denně) se mohou vyskytnout zažívací potíže, jako jsou bolest břicha a průjem, pocit únavy a slabosti, zvýšené hodnoty cholesterolu.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Vitamin E Zentiva uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu (krabička, etiketa) za zkratkou „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Vitamin E Zentiva obsahuje

Léčivou látkou je tocoferoli alfa acetat.

Vitamin E Zentiva 100 mg: Jedna měkká tobolka obsahuje tocoferoli alfa acetat 100 mg.

Vitamin E Zentiva 200 mg: Jedna měkká tobolka obsahuje tocoferoli alfa acetat 200 mg.

Vitamin E Zentiva 400 mg: Jedna měkká tobolka obsahuje tocoferoli alfa acetat 400 mg.

Pomocnými látkami jsou slunečnicový olej

Obal tobolky: želatina, glycerol 85%, methylparaben, Ponceau 4R (E124), sójový lecitin (62 %), Miglyol 812.

Jak přípravek Vitamin E Zentiva vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: červené měkké oválné želatinové tobolky.

Velikost balení:

30 tobolek po 100 mg.

30 tobolek po 200 mg.

20 nebo 30 tobolek po 400 mg.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

Výrobce

Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 18. 5. 2021